

ADEBAR in Münster



Zwischenstand Februar 2008

Ein paar Takte vorweg

2005 bis 2007 wurde in und um Münster auf 22 TK25-Quadranten die sog. mittelhäufigen Brutvogelarten kartiert – ein ganz ordentlicher Beitrag für ADEBAR und den neuen NRW-Atlas!

Vor der letzten Kartiersaison 2008 haben wir einmal einen Kassensturz gemacht, alle Daten in eine Datenbank gekloppt, die Brutbestände in den vorgegebenen Größenklassen geschätzt und das Ganze kartografisch dargestellt. Einerseits natürlich, um endlich das Werk vieler Hundert Kartierstunden in einem kleinen „Brutvogelatlas von Münster“ ansehen und Vergleiche mit dem Westfalen-Atlas (Kartierung um 1990) anstellen zu können. Andererseits aber auch, um noch vorhandene Lücken und Unklarheiten hinsichtlich der Einordnung der einen oder anderen Art aufzudecken.

Wir möchten euch daher beim Durchsehen der Karten um drei Dinge bitten:

1. Wenn ihr denkt, dass eine Größenklasse nicht passt, teilt uns das bitte mit – am besten direkt mit eurer Einschätzung.
2. Notiert bitte alles Brutverdächtige, insbesondere der selteneren Arten (s. folgende Übersicht).
3. Wenn ihr auf ein Fragezeichen stoßt, überlegt, ob ihr helfen könntet, dieses durch eine Größenklasse zu ersetzen, indem ihr
 - a) aufgrund von Beobachtungen oder vorhandener Daten eine Schätzung vornehmt oder
 - b) selbst zu Fernglas und Kartierbrett greift. Oft kann man mit einer Tour schon ein Fragezeichen ausradieren! Wann man am besten für die einzelnen Art rausgehen sollte, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten, ebenso was am vordringlichsten ist. Bitte meldet euch aber, bevor ihr aktiv werdet!

Vielen Dank sagen *Lars und Johannes*

(E-Mail: lars.gaedicke@uni-muenster.de oder wahl@uni-muenster.de)

Wenn ihr in diesem Frühjahr draußen unterwegs seid, achtet bitte speziell in den ?-Quadranten auf Folgendes:

Gewässer:

- bei allen Gänsen, Schwimm- und Tauchenten außerhalb der Rieselfelder auf alles Brutverdächtige (z.B. im Venner Moor an der Ems und im Handorfer Feuchtgebiet)
- an Brücken von Kanal und Aa auf Gebirgsstelzen

Wälder und halboffene Landschaft:

- ab Mai auf singende Trauerschnäpper, Waldlaubsänger, Gartenrotschwänze, Gelbspötter, Turteltauben, Kuckucke, Nachtigallen sowie
- brutverdächtige Wacholderdrosseln und
- Brutzeitbeobachtungen von Sperbern, Baumfalken

Offenland:

- Rebhühner (bitte alle Beobachtungen außerhalb der Loddenheide notieren) und Rohrweihen (außerhalb Rieselfelder)
- brutverdächtige Austernfischer (überall notieren)
- an Baumschulen, Baugebieten etc. auf Bluthänflinge

Siedlungen:

- singende Girlitze und Birkenzeisige (alle Beobachtungen) notieren.

Anregungen für gezielte Kartierungen in ?-Quadranten

Siedlungen:

- in der zweiten Maihälfte abends gezielte Kontrollen für Mauersegler in Mecklenbeck, Bösensell, Schapdetten, Davensberg, Ottmarsbocholt, Alexianer-Krankenhaus (Kappenberger Damm), Dorbaum-Kaserne, Westbevern, Greven, Gelmer und Wolbeck
- Gezielte Suchen nach Birkenzeisigen in Gievenbeck, Mecklenbeck, Handorf, Telgte und Wolbeck

Greifvögel und Eulen:

- bei schönem Wetter im April Kartierung von Sperber und Mäusebussard
- im Mai Wespenbussard
- im Juni/Juli Kartierung piepsender junger Waldohreulen (vielleicht unser größtes ADEBAR-Sorgenkind)

Offenland:



- Mehl- und Rauchschwalben an Gehöften sowie Schafstelzen in (Getreide)Feldern

➔ alles ist prima im Rahmen einer Fahrradtour machbar!

In einigen Quadranten müssen noch fast alle Arten kartiert werden. Bitte melden, wer Interesse an einer Mitarbeit hat!

Herzlichen Dank!



Nils Anthes, Vera Bellenhaus, Anja Berndt, Petra Dieker, Daniel Doer, Kerstin Gonschorrek, Christoph Grüneberg, Christian Imholt, Anna Jess, Holger Lauruschkus, Andreas Leistikow, Anette Lilje, Kristian Mantel, Manfred Röhlen, Nicole Schlienz, Alexander Salz, Christoph Sudfeldt, Kim Timmermann, Bernd Walther, Dirk Wewers, Lisa Wiesmann, Thomas Wiesmann und Silas Wolf



Veränderung: (Zunahme)

To Do:



- ?-Quadranten potenzielle Brutplätze kontrollieren



Veränderung: Zunahme

To Do:



- größere Gewässer in ?-Quadranten gezielt aufsuchen (April)



Veränderung: Zunahme

To Do:



- potenzielle Brutgewässer gezielt kontrollieren (April)



Veränderung: deutliche Zunahme

To Do:



- auf alles Brutverdächtige außerhalb der Rieselfelder achten



Veränderung: deutliche Zunahme

To Do:



- auf alles Brutverdächtige außerhalb der Rieselfelder achten



Veränderung: deutliche Zunahme

To Do:



- auf alles Brutverdächtige achten



Veränderung: (Zunahme)

To Do:



- Gibt es Brutverdächtiges außerhalb der Rieselfelder?



Veränderung: Zunahme

To Do:



- potenzielle Brutgebiete gezielt kontrollieren:
Venner Moor, Handorfer Feuchtgebiet,
Ems-Altarme



Veränderung: Abnahme?

To Do:



- potenzielle Brutgebiete gezielt kontrollieren:
Venner Moor, Handorfer Feuchtgebiet,
Ems-Altarme



Veränderung: (stabil)

To Do:



- potenzielle Brutgebiete gezielt kontrollieren:
Venner Moor, Handorfer Feuchtgebiet,
Ems-Altarme



Veränderung: leichte Zunahme

To Do:



- potenzielle Brutgebiete (Handorfer Feuchtgebiet, Emsaltarme, Hiltruper See?) gezielt kontrollieren



Veränderung: (stabil)

To Do:



- Kontrolle offener Quadranten



Veränderung: leichte Zunahme

To Do:



- Kontrolle offener Quadranten



Veränderung: (stabil)

To Do:



- Kontrolle potenzieller Brutplätze: Handorfer Feuchtgebiet, Venner Moor



Veränderung: (stabil)

To Do:



- in ?-Quadranten gezielte Kontrolle von Baugebieten, lückigen Ruderalfluren a la Loddenheide



Veränderung: (stabil)

To Do:



- alle Sänger außerhalb der Rieselfelder notieren



Veränderung: ?

To Do:



- singende M außerhalb der Rieselfelder notieren



Veränderung: stabil

To Do:



- alle Beobachtungen notieren (v.a. Brutverdächtiges)



Veränderung:?

To Do:



- gezielte Kontrolle der Abgrabungsgewässer und der Ems im Juni/Juli



Veränderung: (stabil)

To Do:



- Notierung aller singenden M im Mai und Juni
- gezielte Kontrolle von Brücken am Kanal und an der Aa



Veränderung: stabil

To Do:



- alle Beobachtungen notieren!



Veränderung: (stabil)

To Do Orni AGisten:



- alle Beobachtungen notieren!
- gezielte „Greifvogel-Spazierfahrt“ tagsüber im April (sonnig, warm, windstill)



Veränderung: (stabil)

To Do:



- in ?-Quadranten gezielte „Greifvogel-Spazierfahrt“ tagsüber im April (sonnig, warm, windstill)



Veränderung: Abnahme oder nicht entdeckt?

To Do:



- gezielte Kontrolle im Mai nach kreisenden und balzenden Vögeln (Mäusebussarde balzen dann nicht/kaum!)



Veränderung: stabil

To Do:



- auf alles Brutverdächtige achten!
- gezielte Suche ab Mitte Mai und im Juni (Feuchtgebiete!)
- Kombination mit Schwalben!



Veränderung: (stabil)

To Do:



- in ?-Quadranten gezielte „Greifvogel-Spazierfahrt“ tagsüber im April (sonnig, warm, windstill)



Veränderung: (stabil)

To Do:



- ?-Quadranten kartieren



Veränderung: deutliche Zunahme

To Do Orni AGisten:



- ?-Quadranten im April sauber kartieren



Veränderung: starke Zunahme und Ausbreitung

To Do:



- „Mr. Mittelspecht“ Holger Lauruschkus auf ein Bier einladen ...



Veränderung: stabil

To Do:



- ?-Quadranten kartieren



Veränderung: Zunahme

To Do:



- ?-Quadranten kartieren (März, April / Juni)



Veränderung: Abnahme?

To Do:



- ?-Quadranten kartieren



Veränderung: (stabil)

To Do:



- alle Sänger außerhalb der Davert notieren
- nochmals gezielte Kontrolle v.a. geeigneter Wälder Ende April/Anfang Mai



Veränderung: deutliche Abnahme

To Do:



- ?-Quadranten (nach)kartieren



Veränderung: (sehr) starker Rückgang

To Do:



- Notierung aller singenden M im Mai und Juni
- gezielte Kontrolle lichter Wälder, von Windwurfflächen, Kleingartenanlagen (sehr früh morgens!)



Veränderung: unklar

To Do:



- Gesang und Rufe in den mp3-Player und ab in den Wald (März/April)



Veränderung: Abnahme

To Do:



- optionale Art
- Notierung aller singenden M



Veränderung: Abnahme oder Unterschätzung?

To Do:



- ?-Quadranten kartieren



Veränderung: (Abnahme)

To Do:



- ?-Quadranten kartieren
- alle Brutzeitbeobachtungen notieren
- gezielte Erfassung piepsender Jungvögel (Juni)



Veränderung: starke Abnahme

To Do:



- alle singenden Turteltauben notieren!
- wie und wo könnte eine gezielte Nachsuche erfolgen?



Veränderung: ??

To Do:



- bringt den Gimpeln einen ordentlichen Gesang bei!



Veränderung: deutliche Abnahme

To Do:



- alle rufenden Vögel ab Mai notieren



Veränderung: leichter Rückgang(?)

To Do:



- ?-Quadranten kartieren (Anfang Mai)



Veränderung: (starke?) Abnahme

To Do:



- Notierung aller Beobachtungen singender M oder von Trupps von Mitte April bis Juni
- gezielte (Nach)Kontrolle von Baumschulen, Baugebieten, Brachen, Dörfer



Veränderung: (deutliche?) Abnahme

To Do:



- Notierung aller singenden M ab Ende Mai
- gezielte Kontrollfahrten im Juni
(Kombination mit Schafstelze und Schwalben)



Veränderung: ?

To Do:



- alle verdächtigen Wacholderdrosseln notieren!



Veränderung: deutliche Abnahme

To Do:



- hoffen, dass es nicht noch schlimmer kommt



Veränderung: ?

To Do:



- Notierung aller singenden Vögel von Mitte Mai bis Ende Juni
- gezielte Kontrolle von Stromtrassen (Wälder!), Feuchtgebieten und Windwurfflächen



Veränderung: Zunahme?

To Do:



- auf alles Brutverdächtige achten!



Veränderung: Zunahme?

To Do:



- ?-Quadranten im April abfahren



Veränderung: (deutlicher?) Rückgang

To Do:



- alle Beobachtungen notieren (und ggf. auch ältere über MSOrni abfragen)!
- ?-Quadranten im März (nach)kartieren



Veränderung: stabil

To Do:



- alle Brutzeitbeobachtungen (Mai/Juni) außerhalb der Rieselfelder notieren
- Achtung: brütet auch in Kornfeldern



Veränderung: Zunahme

To Do:



- Felder im Juni gezielt nach fütternden Altvögeln absuchen (auffällig v.a. in Kornfeldern)



Veränderung: leichte Abnahme

To Do:



- relax



Veränderung: Abnahme?

To Do:



- Tour de Bauernhof Anfang Juni



Veränderung: ?

To Do:



- Tour de Bauernhof Anfang Juni



Veränderung: (stabil)

To Do Orni AGisten:



- Gezielte Kontrolle in Mecklenbeck, Bösensell, Schapdetten, Davensberg, Ottmarsbocholt, Alexianer-Krhs, Dorbaum-Kaserne, Westbevern, Greven, Gelmer, Wolbeck (zweite Maihälfte abends)



Veränderung: (Zunahme)

To Do:



- Überprüfung der Schätzung in der Innenstadt



Veränderung: Abnahme?

To Do:



- Schätzungen prüfen



Veränderung: stabil

To Do Orni AGisten:

- Notierung aller Beobachtungen im Mai und Juni
- gezielte Kontrollen: Gievenbeck, Mecklenbeck, Handorf, Telgte, Wolbeck



Veränderung: leichte Abnahme

To Do:

- Notierung aller singenden M